



## ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

## ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ତିପିଲିମା

ସଂଖ୍ୟା - ୩୯ (ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକ୍ସନ୍)

ସପ୍ତାହ - ୨୦

ତାରିଖ: ୧୪.୦୪.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା - ବରଗଢ

## ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୁର୍ବାନ୍ତମାନ

ପାଣିପାଗ କାରକ	୧୫-୦୪-୨୦୨୪	୧୬-୦୪-୨୦୨୪	୧୭-୦୪-୨୦୨୪	୧୮-୦୪-୨୦୨୪	୧୯-୦୪-୨୦୨୪
ବୃଷ୍ଟିପାତ୍ର (ମିଲି ମିଟର)	୨	୦	୦	୦	୦
ସର୍ବାଧିକ ଭାପମାତ୍ରା (୩ ସେଣ୍ଟିମେଟ୍ରୋ)	୩୯	୩୯	୪୦	୪୦	୪୧
ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାପମାତ୍ରା (୩ ସେଣ୍ଟିମେଟ୍ରୋ)	୨୮	୨୮	୨୮	୨୯	୨୯
ମେଘ ଆବରଣ (ଓକଟା)	୪	୩	୩	୨	୨
ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକତା %)	୪୭	୪୭	୪୪	୩୭	୩୪
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକତା %)	୧୭	୧୭	୧୪	୧୧	୧୧
ପବନର ବେଗ (କମ୍ପି/ଘଣ୍ଠା ପ୍ରତି)	୧୨	୧୦	୧୨	୧୭	୧୭
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	୨୦୦	୧୭୧	୨୧୯	୨୩୦	୨୪୪

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାନ୍‌ଦୀପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟେଲିଫୋନ୍ # ୦୬୭୪-୨୫୧୯୬୧୧୮୮ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

## ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ ସ୍ଥୁତନା :

ଭାରତ ପାଣିପାଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମୌସମ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁୟାୟୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ବାଦନା କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦି' ଟା ଛାନରେ ଅତି ସ୍ଵଚ୍ଛ ବର୍ଷା ସହିତ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘାଳୁଙ୍କ ରହିପାରେ । ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମା ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ରୁ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ରୁ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ବାଦନା ରହିଅଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୩୫ % ରୁ ୪୭ % ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୧୩ % ରୁ ୧୭ % ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ବାଦନା ରହିଅଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ରୁ ୧୭ କି.ମି. ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପର୍ବ୍ତୀ, ପର୍ବ୍ତୀମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପର୍ବ୍ତୀମ ଦିଗର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ବାଦନା ରହିଅଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ

- ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଉଷ୍ଣ ଲହୁରୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଫସଳ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସତର୍କତା ଅବଳମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଫସଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାଇ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଯମିତ ସିଂହନ ପ୍ରଶାଳୀରେ ଜଳସେବନର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବା, ଫଳ ଓ ପନ୍ଥିପରିବା କ୍ଷେତରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଥୁନ, ପୁଆଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଫସଳ ଅବଶେଷକୁ ଆବରଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୋଗ କରିବା, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଡି ଖରାରୁ ବଂଚାଇବା ପାଇଁ ଛାଇଁରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତଥା ଦିପହର ସମୟରେ କାମ ନ କରାଇବା ଜ୍ୟୋତି ।
  - ପ୍ରତିକିତ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ଛାପି ରହିଅଛି ତାହା ଆଗକୁ ଫସଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋକ ଏବଂ ଗୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ବତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉପଦେଶ

କଷି ଏବଂ ପଶ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ

ପ୍ରସାର ଧାରା	ପ୍ରସାର ଧାରା	ନୂତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଜଣକ ଧାରା
ଡାକୁଆ ଧାନ	ଦୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା / ଦାନା ଉଚିତ ଓ ବିକଶିତ ହେବା / ପରିପକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ଗଛରେ ୮୦ କିମ୍ବା ତା'ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରତିଶତ କେଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଦାନା ପରିପକ୍ଷ କିମ୍ବା ହ୍ରଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଗଲାଣି ସେଥିରେ ଧାନ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବିଥିଲୁ । ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ କାଟିକି ବାହାରେ ଶୁଷ୍କବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା'କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ଛିଟି ରହିଅଛି ତାହା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକତୀ ପୋକର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧାନରେ ପ୍ରତି ହେବୁର ପିଛା । ୪୦ ମିଲି ଗ୍ରାଇଫ୍ଲୁମେଜୋପାଇରିମ କିମ୍ବା ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ପାଇମେଟ୍ରୋଯାଇନକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗକୁ ଦେଖୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
ମୁଗ(ଖରା ଦିନିଆ)	ପରିପକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା / ଫଳ ତୋଳିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଯଦି ମୁଗ ଗଛରେ ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଫଳ ପରିପକ୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଫଳ ତୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । ଏହାର ବିହନକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଫସଲକୁ ଖରାରେ ଭଲଭାବରେ ସୁଖାତ୍ମକ ଯେପରିକି ଦାନା/ମଞ୍ଜିର ଆର୍ଦ୍ରତା ୮ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।</li> </ul>
ଆୟ	ଫଳ / ପରିପକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆୟ ଗଛରେ ଫଳ ମାଛିର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫଳ ମାଛି ଟ୍ରାପର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> <li>ଯଦି ଫଳର ଅଗରେ କଳା ଦାଗ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହାରେ ଗଛରେ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫଳର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଳ ଝତିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦନା ବନିପାରେ ତେଣୁ ତାଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବନାଇ ରଖିବାକୁ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> </ul>
ପନିପରିବା	ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ବର୍ଷା ନ ହେବା ଛିଟିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । ପ୍ରତଳିତ ପାଣିପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୋଷକ ପୋକମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ବାଦନା ଦେଖାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଯଦି ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଏ ତା'ହେଲେ ୦.୨ ରୁ ୦.୩ ଗ୍ରାମ ଥାଯାମିଥୋକ୍ତଜାମ ୨୫ % ଡକ୍କୁ ଜି. କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋରପ୍ରିଡ ୧୭.୮ % ଏସ.୧୬. @ ୦.୩ ମିଲିଲି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଯଦି ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଟି ଏବଂ ଚମାଚର ଗଛରେ ପତ୍ରଖୁଆ ସମାଳୁଆ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଇମାମେକଟିନ୍ ବେନ୍‌ଯୋଏଡ଼କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗକୁ ଦେଖୁ ଗଛରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
ଗାଇ ଓ ମଇଷି		<ul style="list-style-type: none"> <li>ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଜା ସ୍ଵକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ, ପୁଷ୍ଟିସାର-ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମିଶ୍ରିତ ଖଣ୍ଡିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଇଁରେ ରଖିବା ତଥା ସକାଳ ୧୧ ଟା ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚରାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> </ul>
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଉଷ୍ଣ ଲହରୀ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାର୍ମରେ ଥିବା ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ା ଅଖା ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାଗରେ ଏବଂ ଛାତକୁ ପୁଅଲ କିମ୍ବା ନଢ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ସେତେରେ ପବନର ଚଳପ୍ରଚଳ କିମ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଥିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଉଷ୍ଣ ଲହରୀ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଗମିନ୍ ଇ ଏବଂ ସି ସମ୍ମିମେଷ୍ଟକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ । ରାନ୍ନିକ୍ଷେତ୍ର ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଏବଂ କୁମି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇପି ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ଛିଟି ରହିଅଛି ତାହା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକତୀ ପୋକର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧାନରେ ପ୍ରତି ହେବୁର ପିଛା । ୪୦ ମିଲି ଗ୍ରାଇଫ୍ଲୁମେଜୋପାଇରିମ କିମ୍ବା ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ପାଇମେଟ୍ରୋଯାଇନକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କିଲା ପାଗକୁ ଦେଖୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
ମୁଗ(ଖରା ଦିନିଆ)	ପରିପକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା / ଫଳ ତୋଳିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଯଦି ମୁଗ ଗଛରେ ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଫଳ ପରିପକ୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଫଳ ତୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । ଏହାର ବିହନକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଫସଲକୁ ଖରାରେ ସୁଖାତ୍ମକ ଯେପରିକି ଦାନା/ମଞ୍ଜିର ଆର୍ଦ୍ରତା ୮ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।</li> </ul>
ଆୟ	ଫଳ / ପରିପକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆୟ ଗଛରେ ଫଳ ମାଛିର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫଳ ମାଛି ଟ୍ରାପର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> <li>ଯଦି ଫଳର ଅଗରେ କଳା ଦାଗ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହାରେ ଗଛରେ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫଳର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଳ ଝତିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦନା ବନିପାରେ ତେଣୁ ତାଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବନାଇ ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> </ul>
ପନିପରିବା	ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ବର୍ଷା ନ ହେବା ଛିଟିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । ପ୍ରତଳିତ ପାଣିପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୋଷକ ପୋକମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ବାଦନା ଦେଖାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । ଯଦି ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଏ ତା'ହେଲେ ୦.୨ ରୁ ୦.୩ ଗ୍ରାମ ଥାଯାମିଥୋକ୍ତଜାମ ୨୫ % ଡକ୍କୁ ଜି. କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋରପ୍ରିଡ ୧୭.୮ % ଏସ.୧୬. @ ୦.୩ ମିଲିଲି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଯଦି ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଟି ଏବଂ ଚମାଚର ଗଛରେ ପତ୍ରଖୁଆ ସମାଳୁଆ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଇମାମେକଟିନ୍ ବେନ୍‌ଯୋଏଡ଼କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗକୁ ଦେଖୁ ଗଛରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
ଗାଇ ଓ ମଇଷି		<ul style="list-style-type: none"> <li>ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଜା ସ୍ଵକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ, ପୁଷ୍ଟିସାର-ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମିଶ୍ରିତ ଖଣ୍ଡିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଇଁରେ ରଖିବା ତଥା ସକାଳ ୧୧ ଟା ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚରାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।</li> </ul>
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଉଷ୍ଣ ଲହରୀ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାର୍ମରେ ଥିବା ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ା ଅଖା ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାଗରେ ଏବଂ ଛାତକୁ ପୁଅଲ କିମ୍ବା ନଢ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ସେତେରେ ପବନର ଚଳପ୍ରଚଳ କିମ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଥିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଉଷ୍ଣ ଲହରୀ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଗମିନ୍ ଇ ଏବଂ ସି ସମ୍ମିମେଷ୍ଟକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ । ରାନ୍ନିକ୍ଷେତ୍ର ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଏବଂ କୁମି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇପି ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।</li> </ul>

- କୃଷି ରେ ଭରମ ଲାଇ ପାଇଁ, **OUAT KALINGA** ପ୍ରତକୃସ (ବିହନ, ଚାରା ରୋପଣ ଓ କ୍ୟୁପିଏମ, ଚିସ୍ତୁ କଲଚର ଗ୍ଲ୍ଯାଫ୍, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ ଉପାଦାନ, ପିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ/ଇଯରଲିଙ୍ଗ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ମହୁମାଛି ଓ ସ୍ବୋଦ, ଜେଇବ ଘାର, ଜେଇବ କାଟମାନକ, ଜିଆ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବନୂମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଛିଟିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ